

## دستورالعمل واکسیناسیون حیوانات کوچک / خانگی

به منظور تأمین سلامت و سلامت حیوانات کوچک یا خانگی و حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در امر واکسیناسیون و ایمن سازی حیوانات خانگی به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های عفونی و واگیر با همکاری جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک به شرح زیر تدوین، تأیید و توصیه می شود:

### ۱- واکسن های سگ

الف- واکسن علیه بیماری های عفونی سگ که اغلب به صورت واکسن چندگانه سگ عرضه می گردد و شامل موارد زیر می شود:

نام واکسن / بیماری	نوع واکسن	زمان تجویز	تکرار	روش تجویز
دبستمپر	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده
آدنووایروس (-CAV2)	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده
پاروویروس	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده
پاراآنفلوانزا	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده
لپتوسپیرو	کشته	۱۲ هفتگی، سپس ۳-۴ هفته بعد	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده

\*در صورت تجویز اولین واکسن در بالای سن ۱۶ هفتگی، نیازی به بوستر نمی باشد و واکسیناسیون سالانه تکرار می شود.

ب: واکسن هاری

این واکسن کشته بوده و در سن ۱۲ هفتگی تجویز می گردد.

نام واکسن / بیماری	نوع واکسن	زمان تجویز	تکرار	روش تجویز
هاری	کشته	۱۲ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده

## ۲- واکسن های گربه

الف- واکسن علیه بیماری های عفونی گربه که به صورت واکسن سه گانه گربه عرضه می گردد و شامل موارد زیر می شود.

نام واکسن / بیماری	نوع واکسن	زمان تجویز	تکرار	روش تجویز
پن لکوپنی	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده
هرپس ویروس گربه	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده
کلسی ویروس گربه	زنده تخفیف حدت یافته (MLV)	۶-۸ هفتگی، سپس هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده

\*در صورت تجویز اولین واکسن در بالای سن ۱۶ هفتگی، نیازی به بوستر نمی باشد و واکسیناسیون سالانه تکرار می شود.

ب- واکسن هاری این واکسن کشته بوده و در سن ۱۲ هفتگی تجویز می گردد.

نام واکسن / بیماری	نوع واکسن	زمان تجویز	تکرار	روش تجویز
هاری	کشته	۱۲ هفتگی	سالانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده

## ۳- واکسن های جوندگان

برنامه واکسیناسیون برای جوندگان و سایر حیوانات اگزوتیک، توصیه نمی شود.

## ۴- واکسن های پرندگان زینتی

نام واکسن / بیماری	نوع واکسن	زمان تجویز	تکرار	روش تجویز
نیوکاسل	کشته	بدو تولد	برای شاهین سانان و ماکیان تکرار سالیانه	SC یا IM بر اساس توصیه شرکت سازنده

\* بجز راسته های غواص سانان، کشیم سانان، کبوتر دریایی سانان، پلیکان سانان، لک سانان و غاز سانان

یادآوری: دستورالعمل واکسیناسیون حیوانات کوچک/ خانگی بر اساس شرایط و وضعیت بیماری های واگیر، سالانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.